



# Νέα θεραπεία για τη δισκοπάθεια

**O**κτώ στους δέκα ενήλικες βιώνουν μόνιμα ή περιστασιακά οδυνηρούς πόνους στη μέση, στον αυχένα ή σε κάποιο από τα άκρα, ως συνέπεια τραυματισμών, απότομων κινήσεων και μηχανικών βλαβών που καταστρέφουν τους μεσοσπονδύλιους δίσκους. Η χειρουργική αντιμετώπιση μιας τέτοιας βλάβης ήταν και παραμένει η βασική θεραπεία. Αλλά η εμπειρία από επώδυνα, με μακρά περίοδο ανάρρωσης ή ακόμη και αποτυχημένα χειρουργεία, κάνει τους περισσότερους ασθε-

στον μεσοσπονδύλιο δίσκο, στην περιοχή της βλάβης.

Το ενδοδισκικό gel τοποθετείται υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση και με τοπική αναισθησία, με λεπτή βελόνα, μέσα στο μεσοσπονδύλιο δίσκο, στην περιοχή που βρίσκεται ο κατεστραμμένος πικτοειδής πυρήνας. Το υλικό, δρώντας με ωσμωτική πίεση, έχει την ιδιότητα να συγκεντρώνει πάλι τον πικτοειδή πυρήνα σε μια ενιαία μορφή. Έτσι, όλα τα αποσπασμένα τμήματά του – που έχουν δημιουργήσει κίλες – επαναδιοργανώνονται και τον επαναπρέπουν, κατά το δυνατόν, στην